

## GEHÖLZKRANKHEITEN

### FORSYTHIE

*Cladosporium forsythiae*

#### SYMPTOME

Auf den Blättern bilden sich unscharf abgegrenzte Flecken, die anfangs leicht ölig aussehen, sich später aufwölben und verbräunen. Jüngere Blattflecken sind auch von einem gelblichen Rand umgeben. Erste Beobachtungen zeigen, dass schwächer wachsende Sorten stärker betroffen sind.

#### SCHADORGANISMUS

Junges Myzel des Pilzes ist hell, nur wenige verzweigt, dünn und besitzt nur wenige Septen. Älteres Myzel ist bräunlich und dicker, stark septiert und verzweigt. Die Konidien des Pilzes sind mehr oder weniger oval, oft an einer Seite zugespitzt und an beiden Enden abgerundet. Manchmal sind sie auch birnförmig und septiert. Die Konidien hängen in langen Ketten zusammen. Ihre Größe variiert zwischen 5-18 x 3-5 µm.

#### GEGENMASSNAHMEN

Nach Möglichkeit keine Überkronenberegnung durchführen, immer zum Stammgrund gießen. Die Dauer der Blattnässe hat nämlich großen Einfluss auf Infektionen durch diesen Pilz. Nachdem dieser Blattfleckenpilz in Wien zunächst nur punktuell aufgetreten ist, sollte seine weitere Verbreitung im Auge behalten werden.

Erste Symptome



Fortgeschrittener Befall



Symptome blattunterseits

