

ACKER-WINDE (*Convolvulus arvensis*)

FAMILIE: Windengewächse (*Convolvulaceae*)



PFLANZENMERKMALE

Die Pflanze ist meist kahl, selten etwas kurzhaarig. Der Stängel ist niederliegend oder windend. Alle Laubblätter sind deutlich gestielt. Die Blattspreite ist spieß- bis pfeilförmig gestaltet. Die Blätter sind fast kahl. Die einzelnen, lang gestielten, blattachselständigen Blüten zeigen eine rosarote bis weiße Färbung. Meist haben die Blüten 5 purpurne Streifen. Die Blüten sind 15 bis 25 mm lang und messen bis zu 30 mm im Durchmesser. Sie blühen nur einen halben Tag lang. Der Kelch hat keine Vorblätter. Die Narbe ist zweiteilig, der Fruchtknoten ist zweifächrig.

LEBENSDAUER: ausdauernd.

BLÜTEZEIT: Juni bis September.

STANDORTE: frische bis mäßig trockene Ruderalstellen, Äcker, Gärten, Weinberge, Wegränder, Zäune.

VORKOMMEN: in allen Bundesländern vorkommend; in warm-gemäßigten Zonen weltweit.

BEMERKUNGEN: oft lästiges „Unkraut“.