

GEWÖHNLICHES KANADABERUFKRAUT (*Conyza canadensis*)

FAMILIE: Korbblütler (*Asteraceae*)



PFLANZENMERKMALE: Die Pflanze wird 20 bis 75(100) cm hoch. Der Stängel ist aufrecht und erst im Blütenbereich verzweigt (reichästig mit fast aufrechten Ästen), gerippt, zerstreut abste-
hend steifhaarig und reich beblättert. Der Korbstand aber nicht von Ästen überragt. Die Laub-
blätter sind frischgrün und zerstreut lang behaart, lineal-lanzettlich. Haare am Rand abste-
hend, oft über 0,5 mm lang. Der Korbstand ist rispig angeordnet, zylindrisch bis schmal kegelig, bis
über 100 Köbchen enthaltend. Die zylindrische Hülle ist 3 bis 4 mm lang, gelblich-grün, kahl
bis wenig behaart. Die weißlichen bis blass purpurnen Zungenblüten sind kaum länger als die
4-zipfeligen Röhrenblüten. Der Pappus ist 3x so lang wie die Frucht. Samen ca. 1 mm lang.

LEBENSDAUER: ein- bis zweijährig.

BLÜHZEIT: Juli bis September.

STANDORT: mäßig trocken-frische, nährstoffreiche, sandige, steinige oder reine Ton- und Lehm-
böden; Äcker, Brachen, Straßenränder, Erdaufrisse, Waldschläge, Ruderalstellen.

VORKOMMEN: in Europa von der Ebene bis in mittlere Gebirgslagen.

BESONDERHEITEN: Seit etwa 1700 eingeschleppt und eingebürgert. Heimat ist Nordamerika.