

## GEHÖLZKRANKHEITEN

### CLEMATIS

### *Puccinia magnusiana*

#### SYMPTOME

An Clematis kommen eine Reihe von Rostpilzen vor, am häufigsten jedoch *Puccinia magnusiana*. Es können Blätter und Stiele befallen werden. Auf den Blättern sind blattoberseits gelbliche Flecken sichtbar. Diese Stellen mit den Flecken sind napfförmig vertieft. Auf den Unterseiten dieser napfförmig vertieften Blattflecken befinden sich die Frühjahrssporenlager (Äzidien) des Rostpilzes. Die Sporenlager sind gelblich-orange, länglich, wenn sie mit Sporen gefüllt sind und an ihrer Spitze aufbrechend. Dabei sieht man mit einer Lupe, die nach dem Aufbrechen am Rand des Sporenlagers verbliebenen Reste der Bedeckung des Sporenlagers.

#### SCHADORGANISMUS

*Puccinia magnusiana* ist ein wirtswechselnder Rostpilz. Die Äzidien und Spermogonien werden an Clematis- und Ranunculus-Arten gebildet, die Sommer-, Winter- und Basidiosporen an *Phragmites australis* (= *Phr. communis*), also am Schilfrohr.

#### GEGENMASSNAHMEN

Blätter mit ersten Symptomen (gelbliche Blattflecken noch ohne Sporenlager auf den Blattunterseiten) abpflücken.

Eventuell Fungizide einsetzen (s. [www.ages.at](http://www.ages.at)).

