

GEHÖLZKRANKHEITEN

MANDELRÖSCHEN

Tranzschelia discolor

SYMPTOME

Auf den Blattoberseiten sieht man mosaikartige, kleine gelbe Flecken und blattunterseits braune und schwarze Sporenpusteln. Frühzeitig und stark befallene Blätter vertrocknen und werden abgeworfen.

SCHADORGANISMUS

Mit Hilfe der an den Blattunterseiten gebildeten braunen Sommersporen wird die Krankheit verbreitet. Bis zu sechs Generationen von Sommersporen können entstehen. Im Herbst bilden sich schwarze Wintersporen, mit denen der Erreger an den abgefallenen Blättern überwintert. Von dort gelangen die Wintersporen im Frühjahr auf diverse Anemonenarten. Auf den Blättern der Anemonen bildet der Pilz seine gelben Frühjahrssporen (Äzidien) und gelbbraune Spermogonien (eine weitere Form von Frühjahrssporen) aus. Die Äzidien infizieren in der Folge Blätter von Mandelröschen, aber auch Zwetschken, Pfirsichen, Marillen oder Schlehen. Der Wirtswechsel ist aber nicht obligat, d. h., dass die im Falllaub gebildeten Sporen direkt Infektionen auslösen können.

GEGENMASSNAHMEN

Behandlungen mit Fungiziden (s. unter www.ages.at), sobald die ersten Symptome an den Blattoberseiten sichtbar werden (Kontrolle auf vorhandene Symptome ab Mitte/ Ende Juni).

