

GEHÖLZKRANKHEITEN

WACHOLDER

Phomopsis juniperivora

SYMPTOME

Die Phomopsis-Krankheit des Wacholders wird durch den Pilz *Phomopsis juniperivora* verursacht. Er verursacht ein Verbräunen und Absterben von einzelnen Blättern/Nadeln/Schuppenblättern, Trieben, Zweigen und Ästen. Beim Wacholder sind oft ganze Kronenteile rotbraun, später dann grau. Auf den befallenen Pflanzenteilen sind zahlreiche schwarze, erhabene Punkte (Fruchtkörper) zu sehen, aus denen farblose Sporen austreten (Lupe!).

SCHADORGANISMUS

Infektionen werden gefördert durch dichten Pflanzenbestand, Beschattung, Muldenlagen oder hohe Bodenfeuchte, ebenfalls durch lange Regenperioden bzw. durch Frost und zu spät erfolgte Düngung.

GEGENMASSNAHMEN

Befallenes Pflanzenmaterial entfernen und entsorgen, feuchte und schattige Lagen meiden, sparsam und nicht zu spät im Jahr düngen.

Kurative Anwendung von Fungiziden (siehe Amtliches Pflanzenschutzmittelverzeichnis).



Beginnende Verbräunung von Triebspitzen