

Dickmaulrüsslerschaden an Thuje

Schadbild

An Trieben ist die Rinde abgenagt. Es bleiben zwischen den abgenagten Stellen oft nur kleine Stückchen der Rinde erhalten.



Schädling

Der erwachsene, flugunfähige Käfer ist 9-10 cm groß, braunschwarz gefärbt und weist einen länglich eiförmigen Körper mit breitem, dickem Rüssel auf, an dessen Vorderende die Mundwerkzeuge sitzen. Ab April treten die weiblichen Altkäfer in Erscheinung und beginnen ihre nächtlichen Fraßtätigkeiten an Knospen und austreibenden Blättern. Tagsüber sind sie in der Erde verborgen. Die Ablage der etwa 1 mm großen, kugeligen und gelblich gefärbten Eier erfolgt von Juli bis in den Spätsommer am Wurzelhals bzw. in die humose Erde.



Gegenmaßnahmen

Absammeln der adulten Käfer zur Befallsdruckermittlung. Förderung natürlicher Feinde wie Laufkäfer, Tausendfüßer, Spinnen und insektenfressende Wirbeltiere. Eine häufige Bodenbearbeitung stört die Larvenentwicklung. Biologische Behandlung mit entomophagen Nematoden der Gattung *Heterorhabditis*.