

ACKER-RINDSZUNGE (*Buglossoides arvensis*)

FAMILIE: Raublattgewächse (*Boraginaceae*)

WEITERE NAMEN: Acker-Steinsame, Schminkwurzel, Rothwurz



STANDORT: Äcker (ziemlich häufig in Wintergetreide), Brachen, Ruderalstellen, schwach saure bis neutral-milde lehmhaltige Böden.

VORKOMMEN: in ganz Europa, Ebene bis mittlere Gebirgslagen, bis ca. 800 m.

WUCHSHÖHE: 5 bis 60 cm.

STÄNGEL: aufrecht, einfach, oder oben gering verzweigt, rauhaarig.

KEIMBLÄTTER: eiförmig bis breitoval, Spitze abgerundet, deutlicher Blattnerve, behaart.

LAUBBLÄTTER: eiförmig bis lanzettlich, graugrün, dicht anliegend behaart, wechselständig.

BLÜHZEIT: Mai bis Juli.

BLÜTE: in endständigen, beblätterten Wickeln. Blütenkrone fünfteilig, weiß, selten bläulich oder rötlich, 3 bis 4 mm breit.

FRÜCHTE/SAMEN: Teilfrucht runzelig, braun, dreikantig, eiförmig, kahl.

LEBENSDAUER: einjährig.

BESONDERHEITEN: früher Volksarzneipflanze (zur Empfängnisverhütung).

BEDEUTUNG

In der Landwirtschaft: geringe Konkurrenzkraft; hauptsächlich in Wintergetreide und Rüben.

Im Gartenbau: eher keine.

Im Haus- und Kleingarten: höchstens auf Trockenrasen

ZEIGERWERT FÜR

Temperatur: mäßige Wärme bis Wärme zeigend

Reaktion: schwach saure bis schwach basische Böden zeigend

Stickstoff: auf mäßig stickstoffreichen Böden

LITERATUR

Bedlan, G.: Wildgemüse. Verlag Jugend & Volk Wien, 1997.

Bedlan, G.: Unkräuter - Bedeutung in Gartenbau und Landwirtschaft. Öst. Agrarverlag, 9. Auflage, 2010

Ellenberg, H.; Weber, H. E.; Düll, R.; Wirth, V.; Werner, W.; Paulißen, D.: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Erich Goltze KG Göttingen, 2. A., 1992.

Hanf, M.: Ackerunkräuter Europas mit ihren Keimlingen und Samen. Verlags Union Agrar, 4. A., 1999.