

GROSSER BOCKSBART (*Tragopogon dubius*)

FAMILIE: Korbblütler (*Asteraceae*)



STANDORT: mäßige trockene Wiesen, Ruderalstellen, Wege, Wegränder, Dämme, kalk- und wärmeliebend.

VORKOMMEN: in Österreich in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und im Burgenland collin bis untermontan, im Pannonikum häufig, sonst selten.

WUCHSHÖHE: Die Pflanze wird 20 bis 60 cm hoch.

STÄNGEL: Die Stängel sind meist einköribig.

LAUBBLÄTTER: Am Grunde des Stängels finden sich häufig Reste vorjähriger Blätter. Die Blätter sind schmal lanzettlich, lang zugespitzt und ganzrandig.

BLÜHZEIT: Mai bis Juni.

BLÜTE: Die gelben bis blassgelben Zungenblüten werden von den Hüllblättern deutlich überragt. Der Korbhals ist auffallend verdickt und hohl.

FRÜCHTE/SAMEN: Die Frucht ist meist 30 bis 40 mm lang (inkl. Schnabel). Acht bis 12 Hüllblätter, diese am Rand nicht schwärzlich. Der Pappus ist fedrig.

LEBENSDAUER: ausdauernd.

Zeigerwert für

Temperatur: Wärmezeiger

Feuchte: Trocken- bis Feuchtezeiger

Stickstoff: auf stickstoffarmen Standorten häufiger

LITERATUR

Bedlan, G.: Wildgemüse. Verlag Jugend & Volk Wien, 1997.

Bedlan, G.: Unkräuter - Bedeutung in Gartenbau und Landwirtschaft. Öst. Agrarverlag, 11. Auflage, 2020

Ellenberg, H.; Weber, H. E.; Düll, R.; Wirth, V.; Werner, W.; Paulißen, D.: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Erich Goltze KG Göttingen, 2. A., 1992.

Hanf, M.: Ackerunkräuter Europas mit ihren Keimlingen und Samen. Verlags Union Agrar, 4. A., 1999.