

**EFEU-EHRENPREIS** (*Veronica hederifolia*)

*FAMILIE:* Braunwurzgewächse (*Scrophulariaceae*)



*STANDORT:* lehmige, sandige, kalkreiche, nährstoffreiche Böden; Äcker, Weingärten, Ruderalstellen.

*VORKOMMEN:* in Europa; Ebene bis mittlere Gebirgslagen (bis ca. 730 m).

*WUCHSHÖHE:* 2 bis 10(50) cm.

*STÄNGEL:* niederliegend bis aufsteigend, verzweigt, rund, grün bis rötlich überlaufen, behaart.

*KEIMBLÄTTER:* elliptisch mit ausgezogener Spitze, fleischig, dunkelgrün, kahl.

*LAUBBLÄTTER:* herzförmig-dreieckig, dreilappig bis dreispaltig oder aber viellappig bis viel-spaltig, ganzrandig oder gelappt, dunkelgrün, behaart, kreuzweise gegenständig.

*BLÜHZEIT:* März bis Mai.

*BLÜTE*: achselständig, einzeln, 5 bis 7 mm im Durchmesser. Blütenkrone hellblau mit weißem Zentrum, mit 20 bis 22 dunkleren Längsadern. Staubbeutel ca. 1mm lang, himmelblau. Fruchstiele meist 2- bis 3-mal so lang wie der Kelch. Blüten- und Fruchstiele außerhalb der Haarleiste meist völlig kahl.

*FRÜCHTE/SAMEN*: Samen blassgelb, Mündungsrand deutlich nach innen eingerollt, kaum gerippt, kaum glänzend.

*LEBENSDAUER*: einjährig.

#### *ZEIGERWERT FÜR*

Licht: von ausnahmsweise im vollen Licht bis Halblichtpflanze

Temperatur: Mäßigwärme- bis Wärmezeiger

Feuchte: Frischezeiger

Reaktion: nie auf stark sauren Böden

Stickstoff: auf stickstoffreichen Böden häufig

#### *LITERATUR*

Bedlan, G.: Wildgemüse. Verlag Jugend & Volk Wien, 1997.

Bedlan, G.: Unkräuter - Bedeutung in Gartenbau und Landwirtschaft. Öst. Agrarverlag, 9. Auflage, 2010

Ellenberg, H.; Weber, H. E.; Düll, R.; Wirth, V.; Werner, W.; Paulißen, D.: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Erich Goltze KG Göttingen, 2. A., 1992.

Hanf, M.: Ackerunkräuter Europas mit ihren Keimlingen und Samen. Verlags Union Agrar, 4. A., 1999.