

Gelbe Spargelbohne (*Lotus maritimus*)

Familie: Schmetterlingsblütengewächse (*Fabaceae*)
Wildgemüse - Tonzeiger - Hummelblume



Abbildung: Schlechtendal

Pflanzenmerkmale: Die Pflanze wird bis zu ca. 30 cm hoch. Der nieder liegende bis aufsteigende Stängel ist rund, wenig behaart und hauptsächlich im unteren Bereich rötlichbraun gefleckt, verzweigt. Die wechselständigen Blätter sind kurz gestielt, dreizählig, die Einzelblättchen verkehrt eiförmig und am Ende spitz zulaufend. Am Rand sind sie gewimpert. Die gelben Blüten stehen einzeln in den Blattachseln auf bis zu 15 cm langen Stielen und stehen damit über den Blättern. Der röhriche bis glockige Kelch ist verwachsenblättrig und rötlich gefleckt. Die 5 Kelchzähne sind kürzer als die Kelchröhre und am Rand gewimpert. Die Blüte ist ca. 3 cm lang mit einer großen Fahne, die am Grund durch rötliche Äderchen gekennzeichnet ist. Die wesentlich kürzeren Flügel umfassen das Schiffchen. Die Staubfäden sind miteinander zu einer Röhre verwachsen. Die Hülse ist 4-kantig, kahl und geflügelt.

Lebensdauer: ausdauernd.

Blütezeit: Juni bis Juli.

Standort: Moorwiesen; Kalkmagerwiesen; feuchte Wiesen, Gräben.

Vorkommen: zerstreut; in den Alpen bis ca. 2000 m.

Verwendung: Junge Hülsen und Samen werden zu Gemüse verarbeitet.

Bemerkungen: Die verwandte Art *Tetragonolobus purpureus* wird als Zierpflanze und ebenfalls als Gemüse angebaut.

Die Pflanze hat auch einen hohen Futterwert.