

## **WOLLIGE KRATZDISTEL** (*Cirsium eriophorum*)

FAMILIE: Korbblütengewächse (*Asteraceae*)

UNTERFAMILIE: Röhrenblütige Korbblütengewächse (*Asteroideae*)



### **PFLANZENMERKMALE**

Die Pflanze wird bis zu 150 cm hoch. Der aufrechte Stängel ist verzweigt, wollig behaart aber ohne Dornen. Die länglich eiförmigen Blätter sind wechselständig, tief fiederspaltig mit etwas umgerolltem Rand. Blattoberseits stachelige, blattunterseits eine weißfilzige Behaarung. Die Grundblätter nicht deutlich gestielt mit 2-zipfeligen Fiedern, dornig. Alle Fiederabschnitte fein gezähnt. Die Blätter am Stängel nicht herablaufend. Die Einzelblüten in großen Köpfchen. Blüten zwittrig, bis über 3 cm lang, 5-spaltig, röhrenförmig, rot bis purpurn, zur Blütezeit aber kaum breiter als der oberste Teil der Hülle. Die Hülle mit spinnwebartig verwobenen, stachelspitzigen Hüllblättern. Der Fruchtknoten ist unterständig. Die Früchte zur Fruchtzeit mit fiederhaarigem Flugorgan.

**LEBENSDAUER:** zweijährig.

**BLÜTEZEIT:** Juli bis September.

**STANDORT:** sonnige, steinige Hänge; Magerweiden; Wege, Unkrautfluren.

**VORKOMMEN:** verbreitet bis zerstreut; in den Alpen bis ca. 2000 m.

**VERWENDUNG:** Die, vor allem jungen; Blütenköpfchen werden wegen ihrer Größe wie Artischocken verwendet. Auch junge Triebe und nicht aufgeblühte Blütenköpfchen können zu Gemüse verarbeitet werden.

**BEMERKUNGEN:** Die Insektenbestäubung geschieht durch Falter.