

ACKER-TAUBNESSEL (*Lamium amplexicaule*)

FAMILIE: Lippenblütler (*Lamiaceae*)

WEITERE NAMEN: Stängelumfassende Taubnessel, Rundblatt-Taubnessel



STANDORT: Äcker, Gärten, Brachland, humose, nährstoffreiche, sandig-lehmige Böden.

VORKOMMEN: in ganz Europa, Ebene bis mittlere Gebirgslagen (bis ca. 600 m).

WUCHSHÖHE: 5 bis 20(30) cm.

STÄNGEL: aufrecht, unten ästig, oben weichhaarig, im Querschnitt quadratisch, grün, manchmal auch rötlich überlaufen, kahl.

KEIMBLÄTTER: rund bis oval, klein, mit leicht eingebuchteter Spitze, geöhrt, kahl.

LAUBBLÄTTER: Obere Laubblätter sitzend, stängelumfassend. Gekräuselt, rund bis nierenförmig, ausgebuchtet, gelappt, gekerbt oder gezähnt, behaart und kreuzweise gegenständig. Die unteren Blätter sind gestielt.

BLÜHZEIT: April bis Mai, manchmal auch bis August.

BLÜTE: Kelch abstehend behaart, Blütenkrone, besonders im Vorfrühling, knospenartig geschlossen bleibend und sich nicht weiter entwickelnd. Blüten mit sehr schlanker, weit aus dem Kelch ragender Röhre. Blüten rosa bis karminrot in achselständigen Quirlen.

FRÜCHTE/SAMEN: Samen oval bis länglich mit kleiner weißer Erhebung, ca. 3 mm, weiß bis hellbraun.

LEBENSDAUER: ein- bis zweijährig.

BESONDERHEITEN: bis 20 cm tief wurzelnd. Ameisenverbreitung.